

# 可逆性甲状腺機能低下症

- ① 甲状腺ホルモンを投与せずに様子をみていればよい  
甲状腺機能低下症：一過性可逆性甲状腺機能低下症

- ① 無痛性甲状腺炎
- ② 亜急性甲状腺炎
- ③ 産後一過性甲状腺機能低下症
- ④ クッシング術後一過性甲状腺機能低下症

- ② 甲状腺ホルモンを長期間服用した後服用を中止できる  
甲状腺機能低下症：可逆性甲状腺機能低下症（橋本病でときにみられる）

- ① TSHレセプター抗体 (TRAb : TSAb、TSBAb) に関連した  
自己免疫性慢性甲状腺炎（橋本病）
  - a ブロッキング抗体 (TSBAb) 消失に伴う可逆性甲状腺機能低下症
  - b 母親から児へブロッキング抗体 (TSBAb) 移行による  
新生児一過性甲状腺機能低下症
  - c ブロッキング抗体 (TSBAb)（甲状腺機能低下症）と  
刺激抗体 (TSAb)（バセドウ病）とが同時あるいは継続的に出現
- ② 過剰ヨード摂取による可逆性甲状腺機能低下症：  
ヨード制限により甲状腺機能低下症から回復する
- ③ Rifampicinによる甲状腺機能低下症
- ④ 原因不明